

ES UNO DE LOS 5 TAMICES QUE SE RECOMIENDAN EN LA CARTILLA NACIONAL DE SALUD A PARTIR DEL 2023.



TAMIZAJE			
DETECCIÓN	EDAD RECOMENDADA	FECHA	RESULTADO*
Tamiz metabólico neonatal	Entre el tercer y quinto día de vida		
Tamiz auditivo	Primeros tres meses de vida		
Tamiz oftalmológico	Primer mes de vida		
Tamiz cardíaco	Después de las primeras 24 horas y antes de los 3 días de vida		
Tamiz de cadera	Entre primer y cuarto mes de vida		

*Si el resultado es anormal, tu bebé requiere de atención médica especializada.



Evita cirugías innecesarias en tu bebé o que evolucione a un desgaste prematuro de su cadera.



TAMIZAJE DE CADERA POR MÉTODO GRAF



Es un estudio inofensivo e indoloro para el bebé, brindando al médico una adecuada imagen de la articulación de la cadera.

Displasia de cadera

Es el término médico que se utiliza para describir la patología de la articulación de la cadera, la cual puede ir desde una leve laxitud e inestabilidad, hasta una luxación completa. Se puede presentar desde el nacimiento y durante los primeros meses de desarrollo.

El número de casos actualmente la coloca como la patología más común al nacimiento afectando aproximadamente a:

50 de cada **1000** recién nacidos

La prevención y el diagnóstico temprano son la clave para realizar un tratamiento sencillo antes de que la cadera se luxa y quede de manera incorrecta provocando el desgaste prematuro de la misma.

¿Qué hago en caso de que mi bebé tenga displasia de cadera? A pesar de que la displasia de cadera es una patología muy común, esta puede ser tratada de manera exitosa en la mayoría de los casos si es detectada a tiempo. Una vez detectada la displasia de cadera, tu bebé deberá ser tratado con un aparato ortopédico conocido como Arnés de Pavlik, el cual ayudará a sus caderas a permanecer en la posición idónea para su adecuada corrección. Este aparato no genera ninguna molestia al bebé y hoy en día es considerado el mejor método de tratamiento a nivel mundial. El tratamiento deber ser llevado de manera estrecha por un Ortopedista Pediatra con entrenamiento en ultrasonido con Método GRAF, con la finalidad de darle el mejor seguimiento posible.

Diagnóstico

La displasia o luxación de cadera, generalmente puede ser diagnosticada en el exámen de rutina que realiza el pediatra en cada consulta; sin embargo existen condiciones en las que la afección es **INDETECTABLE** con las maniobras convencionales, por lo que se recomienda **realizar el ultrasonido método GRAF de cadera a TODOS los bebés** desde la cuarta semana de vida hasta los cuatro meses de edad, sobretodo en los siguientes casos:



Si el bebé viene sentado o estuvo sentado durante mucho tiempo en el embarazo.



Chasquido o sensación de "click" en la cadera o con asimetría de pliegues.



Atecedentes familiares de patología de cadera.



Si al nacer el peso es mayor a 4 kg.



Primer embarazo.



Todas las niñas.

¿Cuándo realizar el ultrasonido?

Entre la

4^{ta} y **6^{ta}**

semana de vida
y como máximo la semana 16

En este tiempo es cuando se detecta el problema en específico, las posibilidades de curación usando un arnés ortopédico son muy altas sin requerir cirugía.

Solamente **un médico ortopedista pediatra o radiólogo** con adiestramiento en ultrasonido con método GRAF de cadera puede realizar el ultrasonido de cadera.

